



# DIE GROOT 5 KANKERS WAT VROUE IN SUID-AFRIKA AFFEKTEER


## #3 Kolorektale kanker

'N AKTIEWE GEBALANSEERDE  
LEEFSTYL VERLAAG DIE RISIKO VIR  
KOLOREKTALE KANKER AANSIENLIK



## VROEë OPSPORING IS UITERS BELANGRIK

Meeste kolorektale kankers begin as 'n **POLIEP**, 'n klein uitgroei van weefsel wat in die voering begin en wat later versprei tot in die middel van die kolon of rektum. Dokters kan poliepe tydens 'n kolonoskopie prosedure verwyder.



Gaan vir gereelde kolon siftingstoetse soos 'n kolonoskopie of 'n sigmoïdoskopie vanaf die ouderdom 50 jaar - elke 10 jaar



Sekere KANSA Sorgsentra & Mobiele Gesondheidsklinieke landswyd bied fekale okkultbloedtoetse aan vir kolonkanker (monster van stoelgang word verkry om sodoende klein hoeveelhede bloed op te spoor). Positiewe resultate vereis 'n verwysing na 'n dokter alhoewel dit nie altyd 'n indikasie van kanker is nie.

### Lewensstyl faktore wat bydra tot verhoogde risiko vir kolorektale kanker:



Gebrek aan gereelde oefening



Lae vrugte/groente inname



Lae-vesel & hoë-vet dieet



Oorgewig (vetsug)



Alkohol gebruik



Onvoldoende inname van skoon veilige water



Tabakgebruik

### TEKENS & SIMPTOME

(Baie mense ervaar geen simptome nie)

- ➔ Verandering in dermgewoontes, insluitende diarree / hardlywigheid
- ➔ Rektale bloeding of bloed in die stoelgang
- ➔ Voortdurende abdominale ongemak (krampe/gas/pyn)
- ➔ 'n Gevoel dat die dikderm nie heeltemal ledig nie
- ➔ Swakheid of moegheid
- ➔ Onverklaarbare gewigsverlies

### ANDER RISIKO FAKTORE:

- ➔ Inflammatoriese dermatoestande
- ➔ Persoonlike of familiegeskiedenis van kolorektale poliepe en/of -kanker

# DIE GROOT 5 KANKERS WAT MANS IN SA AFFEKTEER

## #2 Kolorektale kanker

DIT WORD BERAAM DAT **1 IN 79**  
SA MANS KOLOREKTALE  
KANKER SAL ONTWIKKEL



### TEKENS & SIMPTOME

(Jy kan vroeë kolorektale kanker hê sonder simptome)

- Verandering in dermgewoontes
- Gevoel dat die derm nie volledig ontledig is nie
- Rektale bloeding
- Maagpyn
- Swakheid
- Onverklaarbare gewigsverlies



### BEHANDELING & PROGNOSE

- Behandeling word bepaal op hoe ver gevorderd die kanker is
- Behandeling mag insluit chirurgie, bestraling, chemoterapie of 'n kombinasie
- Prognose word ook bepaal op hoe ver gevorderd die kanker is. Vir vroeë fases (Fase 1) kolon of rektum kanker is die vyf-jaar oorlewingskoers omtrent 75%

### SIFTING

- Gaan vir gereelde kolon siftingstoetse soos 'n kolonoskopie of 'n sigmoidoskopie vanaf die ouderdom 50 jaar - elke 10 jaar
- Sekere KANSA Sorgsentra & Mobiele Gesondheidsklinieke landswyd bied fekale okkultbloedtoetse aan vir kolonkanker (monster van stoelgang word verkry om sodoende klein hoeveelhede bloed op te spoor). Positiewe resultate vereis 'n verwysing na 'n dokter alhoewel dit nie altyd 'n indikasie van kanker is nie

### VERLAAG JOU KANKERRISIKO



Gaan gereeld vir sifting



Eet 'n gesonde dieet



Oefen gereeld



Handhaaf 'n gesonde gewig



Moenie rook nie



Vermyn alkohol



Research • Educate • Support

KANSA bied sorg en ondersteuning vir pasiënte wat kolorektale kanker het/gehad het, asook Stoma-sorg en -voorrade